

札幌市認可保育園での 1歳児 窒息死事故から考える～ 保育園の保健安全管理～

講師：五十嵐条子
認可保育園顧問管理栄養士保育士/大学講師

- ・ 事故の概要
- ・ 死因と捜査
- ・ 保育園の対応
- ・ 給食の内容
- ・ 保育園の管理体制
- ・ 保育園では“食事提供”を
どのように考え対応するのか

事故の概要

- ・ 窒息死の原因
 - ・ 肉をのどに詰まらせたことによる
- ・ 食事の内容
 - ・ 離乳食の焼き肉風炒め
 - ・ 幼児食のプルコギを展開して
 - ・ 離乳食として提供



事故発生の際緯

事故の概要

- 2024年10月23日の午前11時過ぎに発生
- 札幌市北区の認可保育園で発生

被害者の状況

- 1歳1か月の男の子が給食をのどに詰まらせた
- 病院に搬送され、その後死亡が確認された

当時の状況

- 焼き肉風の炒め物などにお湯を加えて細かく刻んで離乳食として提供
- 保育士が1対1で食べさせていた
- 突然のどに詰まらせた様子を見せ意識を失った

保育園の謝罪と事後対応

- ・社長の謝罪

- ・お子様の命を失うというあってはならないことが起きた。ご遺族に深くおわびする。

- ・保護者向け説明会の開催

- ・記者会見の開催

- 当時の状況などを説明

記者会見の内容

事故の概要

- 1歳の男の子が給食中に食べ物を喉に詰まらせ死亡
- 事故は北海道札幌市の認可保育園で発生

保育園の対応

- 運営会社が記者会見を開く
- 事故から3週間以上が経過した2024.11月15日に会見

運営会社の謝罪

- 「お子様の命を失うという、保育園では絶対にあってはならないことが起きてしまい、ご遺族に対して深くおわび申し上げます」
- 「大変申し訳ございません」と謝罪

死因の特定

- 男の子の死因

- 肉をのどに詰まらせたことによる窒息死

- 司法解剖の結果

- 先月の司法解剖で明らかに

警察の捜査

- 警察の捜査
 - 園の関係者から話を聞く
 - 業務上過失致死の疑いも視野に入れる
- 慎重な捜査
 - 関係者からの情報収集
 - 過失致死の可能性を考慮

保護者への説明会

2024,11,13日 保護者向けに開催

- 保護者の不満の声

- 対策についての質問に対して
「調査中」との回答のみ

- 具体的な対策が示されないことに
対する不満

当日の給食内容

提供された料理

- 離乳食の焼き肉風炒め

調理方法

- 幼児食のプルコギから水分の多い部分を選定
- お湯を加え、切り刻む
- 水分量を多くして味を薄める
- のみ込みやすくする

給食の提供方法

保育園の運営会社

職員の管理体制については「適切な対応だった」と

説明しました。

保育士の経験

0歳児
クラス

適切な
体制

園児
5名

保育士
2名

保育士2名とも
20年以上の経験

札幌市の特別指導監査

- 事実関係の調査を実施
- 結果は2024年12月上旬に公表予定

認可保育園での事故

- 2024年10月下旬に発生
- 1歳の男の子が給食をのどに詰まらせ死亡

記者会見

- 保育園は2024年11月15日に記者会見を開催
- 当時の状況を説明

いろいろな部門から
注意喚起がなされて
いる



授乳離乳の支援ガイド2019

[000496257.pdf](#)

「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会

令和3年1月20日

食品による子どもの窒息・誤嚥^{ごえん}事故に注意！

—気管支炎や肺炎を起こすおそれも、硬い豆やナッツ類等は
5歳以下の子どもには食べさせないで—

厚生労働省の人口動態調査によると、平成26年から令和元年までの6年間に、食品を誤嚥^{ごえん}して窒息したことにより、14歳以下の子どもが80名死亡していました。そのうち5歳以下が73名で9割を占めていました。特に注意が必要なのは、奥歯が生えそろわず、かみ砕く力や飲み込む力が十分ではない子どもが豆やナッツ類を食べると、のどや気管に詰まらせて窒息してしまったり、肺炎を起こしたりするリスクがあることです。嚥下^{えんげ}シミュレーターを使用し、豆類による窒息・誤嚥^{ごえん}について解析したところ、口の中に豆類が入ったまま走

ス 直前にス竺の運動を行ったり、口をイメージしながらに食べたりすると咽

(1) 豆やナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある食品は5歳以下の子どもには食べさせないでください。

喉頭や気管に詰まると窒息しやすく、大変危険です。小さく砕いた場合でも、気管に入りこんでしまうと肺炎や気管支炎になるリスクがあります。

(2) ミニトマトやブドウ等の球状の食品を丸ごと食べさせると、窒息するリスクがあります。乳幼児には、4等分する、調理して軟らかくするなどして、よくかんで食べさせましょう。

(3) 食べているときは、姿勢を良くし、食べることに集中させましょう。

物を口に入れたままで、走ったり、笑ったり、泣いたり、声を出したりすると、誤って吸引し、窒息・誤嚥^{ごえん}するリスクがあります。

(4) 節分の豆まきは個包装されたものを使用するなど工夫して行い、子どもが拾って口に入れないように、後片付けを徹底しましょう。



ワクチン		種類	乳児期										幼児期					学童期／思春期										
			生 直 後	6 週	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9-11 か 月	12-15 か 月	16-17 か 月	18-23 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上				
B型肝炎	ユニバーサル	不活化			①	②					③		(注1)															
	母子感染予防		①	②					③																			
ロタウイルス	1価	生			①	②	(注2)																					
	5価				①	②	③	(注3)																				
肺炎球菌（PCV15、PCV20）		不活化			①	②	③						④						(注4)									
5種混合（DPT-IPV-Hib）		不活化			①	②	③						④			7.5歳まで			15歳未満まで使用可能									
3種混合（DPT）		不活化													① (注5)						② 11-12歳 (注6)							
2種混合（DT）		不活化																					① 11歳	12歳				
ポリオ（IPV）		不活化																① (注7)										
インフルエンザ菌 b 型（ヒブ） ※アクトヒブ®で初回接種する場合		不活化			①	②	③						④								(注8)							
4種混合（DPT-IPV） ※4種混合ワクチンで初回接種する場合		不活化			①	②	③						④			7.5歳まで			15歳未満まで使用可能									
BCG		生						①																				
麻疹・風疹混合（MR）		生											①						② (注9)									
水痘		生											①		②		(注10)											
おたふくかぜ		生											①						② (注11)									
日本脳炎		不活化						生後6か月から接種可能						① ②	③	7.5歳まで					④ 9-12歳							
不活化インフルエンザ		不活化						生後6か月から接種可能					毎年（10、11月などに）① ②					13歳以上①										
経鼻弱毒生インフルエンザ		生													2歳以上～19歳未満に					毎年（10月、11月などに）① 点鼻								
新型コロナ		mRNA													製剤により使用できる年齢が異なる													
		不活化																										
ヒトパピローマ ウイルス（HPV）	9価	不活化																			(注12)	小6	中1① ② (注13)		中2～高1相当	(注14)		
	2価・4価	不活化																			(注12)	小6	中1 ① ② ③ (注13)		中2～高1相当	(注14)		
ワクチン		種類	生 直 後	6 週	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9-11 か 月	12-15 か 月	16-17 か 月	18-23 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上				

予防接種チェック表

氏名： 生年月日： 年 月 日 ☐ 定期接種 ☐ 任意接種

ワクチン	種類	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回
B型肝炎	不活化	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日			
ロタウイルス	生	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日 1価ワクチン（ロタリックス®）は2回	☐ 接種日 年 月 日 5価ワクチン（ロタテック®）は3回			
肺炎球菌 (PCV15、PCV20)	不活化	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日 スケジュールの（注4）参照	
5種混合 または 4種混合 または 3種混合とポリオ	不活化	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日		
3種混合 (学童期以降の百日咳予防)	不活化					☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日
2種混合	不活化					☐ 接種日 年 月 日	
ポリオ (学童期以降のポリオ予防)	不活化					☐ 接種日 年 月 日	
Hib (インフルエンザ菌b型)	不活化	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日		
BCG	生	☐ 接種日 年 月 日					
麻疹・風疹 (MR)	生	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日				
水痘	生	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日				
おたふくかぜ	生	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日				
日本脳炎	不活化	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日		
インフルエンザ	不活化 or 生	(毎年の接種が推奨されるので、2枚目を参照)					
新型コロナ	mRNA or 不活化	(毎年の接種が推奨されるので、3枚目を参照)					
ヒトパピローマ ウイルス (HPV)	不活化	☐ 接種日 年 月 日	☐ 接種日 年 月 日 15歳未満で始める9価ワクチン（シルガード®9）は2回	☐ 接種日 年 月 日 2価ワクチン（サーバリックス®）、4価ワクチン（ガーダシル®）、15歳以上で始める9価ワクチン（シルガード®9）は3回			



インフルエンザ予防接種チェック表

氏名： _____ 生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

年齢	第 1 回	第 2 回	年齢	第 1 回	第 2 回
6 か月～ 11 か月	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	8 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
1 歳	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	9 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
2 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	1 0 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
3 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	1 1 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
4 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	1 2 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
5 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	1 3 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
6 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	1 4 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
7 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	☐ 不活化 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	1 5 歳	☐ 不活化 ☐ 生 接種日 _____ 年 _____ 月 _____ 日	

生ワクチンは各シーズン 1回接種



新型コロナワクチン予防接種チェック表

接種回数は製剤、接種目的により異なる

氏名：

生年月日： 年 月 日

年齢				
6か月～ 11か月	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日
1歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日
2歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日
3歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日
4歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日
5歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日	
6歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日	
7歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日	

年齢			
8歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日
9歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日
10歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日
11歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日
12歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日
13歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日
14歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日
15歳	製 剤 接種日	☐ 年 月 日	☐ 年 月 日

